

# ROLNIKU - PAMIĘTAJ!

Czas żniw i większy ruch maszyn rolniczych między gospodarstwem a polem to większe zagrożenie przeniesienia wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń do **chlewni**.



**STOSUJ PODSTAWOWE ZASADY BIOASEKURACJI!  
PRZED WSZYSTKIM **DOKŁADNIE UMYJ RĘCE**  
**I ZMIEN ODZIEŻ, OBUWIE PRZED WEJŚCIEM DO**  
**ZWIERZĄT****

## ORAZ



**KAŻDORAZOWO, PO POWROCIE  
Z POLA, OCZYŚĆ I ZDEZYNFEKUJ  
MASZYNY ROLNICZE**



**WYDZIEL W GOSPODARSTWIE  
STREFY PRZECHOWYWANIA  
MASZYN ROLNICZYCH**



**SŁOMA I PASZA POWINNY BYĆ  
PRZECHOWYWANE  
W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA  
DZIKICH ZWIERZĄT  
I GRYZONI**



**SŁOMA ZEBRANA Z OBSZARU  
OBJĘTYMI OGRANICZENIAMI II  
ORAZ III NIE MOŻE BYĆ  
STOSOWANA U ŚWIŃ **PRZES CO**  
**NAJMNIEJ 90 DNI**, A PRZES TEN  
CZAS MUSI BYĆ  
PRZECHOWYWANA W MIEJSCU  
NIEDOSTĘPNYM DLA DZIKÓW  
I GRYZONI**



**ZABRONIONE JEST PODAWANIE  
ŚWINIOM ŚWIEŻEJ ZIELONKI  
I ZIARNA ZEBRANYCH  
Z OBSZARÓW II ORAZ III **PRZES**  
**CO NAJMNIEJ 30 DNI**  
OD ZEBRANIA, A PRZES TEN CZAS  
MUSI BYĆ SKŁADOWANA  
W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA  
DZIKÓW I GRYZONI**



POMORSKA  
INSPEKCJA  
WETERYNARYJNA

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku w związku z realnym zagrożeniem wystąpienia ASF u dzików oraz świń, na terenie powiatu słupskiego, przypominamy o podstawowych zasadach bioasekuracji wymaganych w hodowli trzody chlewnej.